

BBAT 2 SEMINAR

Interrater-reliabilitetstest, gruppearbejde

En deltager spiller patient. En er terapeut. En – to er observatør(er).

Fordel tiden imellem jer så alle kommer igennem de 3 roller.

Brug det udleverede skema.

En observatør passer tiden.

Scoringer

Angiv det tal som først falder dig ind. Gå videre uden at opholde dig for længe ved den enkelte variabel.

Opsummering

Interraterreliabilitet er et mål for enigheden mellem forskellige undersøgere, som vurderer de samme patienter.

Hver gruppe fremlægger erfaringer i plenum.

BBAT 2 seminar
BARS-MQE interrater-reliabilitetstest

Tester nr.	1	2	3	4
1: Kontakt med underlaget				
2: Samling af benene				
3: Symmetrisk stræk				
4: Asymmetriske stræk				
5: Siddende balance				
6: Op – ned langs midtlinjen				
7: Bevægelse fra side til side				
8: Rotation omkring midtlinjen				
9: Armbevægelse - bølgem				
10: Fleksion - ekstension				
11: Relationel bevægelse				
12: Gang				

Tester nr.	1	2	3	4
1: Kontakt med underlaget				
2: Samling af benene				
3: Symmetrisk stræk				
4: Asymmetriske stræk				
5: Siddende balance				
6: Op – ned langs midtlinjen				
7: Bevægelse fra side til side				
8: Rotation omkring midtlinjen				
9: Armbevægelse - bølgem				
10: Fleksion - ekstension				
11: Relationel bevægelse				
12: Gang				

Tester nr.	1	2	3	4
1: Kontakt med underlaget				
2: Samling af benene				
3: Symmetrisk stræk				
4: Asymmetriske stræk				
5: Siddende balance				
6: Op – ned langs midtlinjen				
7: Bevægelse fra side til side				
8: Rotation omkring midtlinjen				
9: Armbevægelse - bølgem				
10: Fleksion - ekstension				
11: Relationel bevægelse				
12: Gang				

Tester nr.	1	2	3	4
1: Kontakt med underlaget				
2: Samling af benene				
3: Symmetrisk stræk				
4: Asymmetriske stræk				
5: Siddende balance				
6: Op – ned langs midtlinjen				
7: Bevægelse fra side til side				
8: Rotation omkring midtlinjen				
9: Armbevægelse - bølgem				
10: Fleksion - ekstension				
11: Relationel bevægelse				
12: Gang				